MAGNES RARE EARTHS

SOLUTION RICHE EN TERRES RARES POUR AIMANTS.

Répété à faible profondeur.

Quatre intervalles de tranchée sélectionnés de 2025 et un intervalle ultérieur de tarière à 2-3 m ont livré 161-278 mg/kg de MREO. Le MREO représentait 42-48 % du DREO en solution.

MÉTHODE DIAGNOSTIQUE COMMUNE

SGS ICM694 | sulfate d'ammonium 0,5 M | pH nominal 4 | 30 minutes | diagnostic, non optimisé

CINQ INTERVALLES SUPERFICIELS SUR UNE ÉCHELLE COMMUNE



PART DES TERRES RARES POUR AIMANTS DANS L'ENSEMBLE

COMPARAISON DE COMPOSITION, PAS DE RÉCUPÉRATION

Les terres rares pour aimants occupent une part proportionnellement plus importante dans l'ensemble dissous.



Résultats diagnostiques sélectionnés. DREO = REO désorbables totaux, exprimés en équivalents oxydes ; MREO comprend les oxydes de Nd, Pr, Dy et Tb.

Valeurs en mg/kg selon la base de déclaration du laboratoire, et non des taux de récupération. Les parts utilisent les totaux d'oxydes non arrondis. Le résultat de tarière provient d'une campagne ultérieure.

Sources : SGS GQ2509210 / GQ2509212 / GQ2514244 / GQ2515205